

## Streefwaarden

	Vitale oudere met DM2 <70 jaar	Vitale oudere met DM2 >70 jaar	Kwetsbare oudere DM2	Laatste levensfase DM2
Behandeldoel	Voorkomen complicaties en symptomatische hypo- en hyperglykemie	Voorkomen complicaties en symptomatische hypo- en hyperglykemie	Voorkomen symptomatische hypo- en hyperglykemie	Voorkomen symptomatische hypo- en hyperglykemie
Glucose	Nuchter 4,5-8 Niet nuchter <9	Nuchter 4,5-8 Niet nuchter <9	Niet nuchter >8 en <15	Niet nuchter >8 en <15-20
Hba1c mmol	<53 (7,0)	Vlgs standaard: 53-64	58 -75	Geen hba1c bepaling
RR	<140/90  Bij micro-albuminurie: <130/80	Vlgs richtlijnen CVRM SBD <140 Lft >80 jr SBD <160	SBD 160-170 DBD ≥70  SBD niet hoger dan 180 SBD niet lager dan 150	Geen
Lipiden	Vlgs CVRM LDL <2,5	Vlgs CVRM LDL <2,5	Primaire preventie: Statine? • Start: Nee • Statine continueren, tenzij klachten  Sec. preventie: Ja  Statine stop bij levensverwachting <2 jaar	Statine stop
Controles	Volgens standaard	Volgens standaard	Uit ketenzorg	Uit ketenzorg
Lab	Volgens standaard	Volgens standaard	Niet standaard: • Lipidespectrum • Micro-albuminurie	Geen: • HbA1C • Lipidespectrum • Micro-albuminurie
Fundusco	1x / 2 jr  1x / 3 jr, na 2 normale funduscontroles	1x / 2 jr  1x / 3 jr, na 2 normale funduscontroles	Bij geen DRP: stop fundusscreening	Stop
Voetco	Volgens standaard	Volgens standaard	Volgens standaard	Stop