

Linacotide (Constella®) bij prikkelbare-darmsyndroom met verstopping

Uw arts heeft met u gesproken over een behandeling met Linacotide. Deze folder geeft u aanvullende informatie over dit medicijn.

Algemene informatie

Linacotide wordt gegeven in een capsulevorm van 290 microgram en is te verkrijgen onder de fabrieksnaam Constella®. Linacotide wordt gebruikt bij de behandeling van het prikkelbare-darmsyndroom met verstopping (obstipatie). Het middel is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met deze aandoening.

Linacotide kan enkel worden voorgeschreven door een specialist en wordt voorgeschreven volgens een vaststaand protocol nadat u onvoldoende heeft gereageerd op andere medicijnen of behandelingen.

Hoe werkt Linacotide?

Linacotide vermindert de overgevoeligheid van de darmen waardoor de pijn zal afnemen. Daarnaast bevordert het de ontlasting doordat de hoeveelheid vocht in de ontlasting toeneemt en de ontlasting sneller door de dikke darm wordt gevoerd. Hierdoor heeft het minder tijd om in te dikken. Indikken van de ontlasting kan leiden tot verstopping (obstipatie).

Hoe gebruikt u Linacotide?

U neemt de capsule éénmaal per dag in. Het wordt geadviseerd om de capsule **een half uur voor een maaltijd** in te nemen. Na 4 weken wordt met u bekeken of het middel voldoende effect heeft.

Wat zijn de bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 op 10 personen voorkomen)

-Diarree

Diarree is normaal gezien van korte duur. Als u echter ernstig of langdurig diarree krijgt (frequente of waterige ontlasting gedurende 7 dagen of langer) en u een licht gevoel in het hoofd krijgt, duizelig wordt of flauwvalt, moet u het gebruik van Linacotide stopzetten en contact opnemen met uw arts.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 op 10 personen voorkomen)

- Maagpijn of buikpijn
- Opgeblazen gevoel
- Winderigheid
- Duizeligheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 op 100 personen voorkomen)

- Verlies van controle over de ontlasting (fecale incontinentie)
- Een licht gevoel in het hoofd bij snel overeind komen

- Uitdroging (dehydratie)
- Verminderde eetlust

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak zij voorkomen

- Huiduitslag

Wanneer moet u contact opnemen?

Krijgt u last van bijwerkingen en gaan deze niet over? Neem dan contact op met uw specialist/ poli MDL (0413 401932) of de voedingsverpleegkundige (0413 402330).

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Hoewel de behandeling met Linaclotide ieder moment kan worden gestopt, adviseren wij om, als u ermee wilt stoppen, dit eerst te bespreken met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Linaclotide nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen mogelijk niet zo goed werken wanneer u ernstige of langdurige diarree heeft:

- Orale anticonceptiemiddelen. Als u zeer hevige diarree krijgt, is het mogelijk dat de anticonceptiepil niet goed werkt en wordt het gebruik van een extra anticonceptiemethode aanbevolen.
- Geneesmiddelen waarvoor een zorgvuldige en exacte dosering vereist is zoals Levothyroxine (een hormoon voor de behandeling van vertraagde schildklierfunctie).

Sommige geneesmiddelen kunnen het risico op diarree verhogen wanneer ze samen met Linaclotide worden gebruikt, zoals:

- Geneesmiddelen voor de behandeling van maagzweren of overmatige maagzuurproductie, protonpompremmers genoemd
- Geneesmiddelen voor verlichting van pijn en ontsteking, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID's) genoemd
- Laxeermiddelen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van Linaclotide bij zwangere vrouwen. Uit voorzorg heeft het de voorkeur het gebruik te vermijden tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Aangezien de systemische blootstelling aan Linaclotide minimaal is, is uitscheiding in de moedermelk niet waarschijnlijk. Het gebruik wordt vanwege het gebrek aan gegevens afgeraden tijdens de borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Dieronderzoek wijst erop dat er geen effect is op de mannelijke of vrouwelijke vruchtbaarheid.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

- Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 31
- Telefoonnummer MDL verpleegkundigen: 0413 - 40 23 30

Meer informatie

meer informatie over prikkelbare darmsyndroom vindt u op de website van de Prikkelbare Darmsyndroom Vereniging www.pdsb.nl

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.

Bernhoven

Nistelrodeseweg 10
5406 PT UDEN

Postbus 707
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40
E: communicatie@bernhoven.nl
I: www.bernhoven.nl



Ga naar
www.zorgkaartnederland.nl

Code: Datum gewijzigd: woensdag 8 november 2017