

## Mantoux (tuberculine-huidtest)

### Wat is de mantouxtest?

De mantouxtest wordt ook wel tuberculine-huidtest genoemd. Hiermee wordt er gekeken of iemand ooit (pas of lang geleden) in aanraking is geweest met de tuberkelbacterie of een tuberculose-infectie heeft gehad.

Er wordt bij deze test een kleine hoeveelheid vloeistof ingebracht net onder de huid van uw linker onderarm. Als uw lichaam antistoffen heeft tegen tuberculose dan kunt u een huidreactie verwachten, zoals roodheid en zwelling op de prikplaats.

Na 2-3 dagen komt u weer terug bij een bevoegd longfunctieanalist om de prikplaats te beoordelen.

### Hoe bereidt u zich voor?

- U mag uw medicatie gewoon doorgebruiken
- Gebruikt u afweerremmende medicatie (bijv. methotrexaat / sulfasalazine) geeft u dit door aan de longfunctieanalist, dit kan invloed hebben op de test.

### Duur

Zowel het plaatsen als aflezen duurt minder dan 10 minuten en wordt gedaan op de functieafdeling, route 110.

---

*Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.*

*Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, [psb@bernhoven.nl](mailto:psb@bernhoven.nl).*

### Bernhoven

Nistelrodeseweg 10  
5406 PT UDEN

Postbus 707  
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40  
E: [communicatie@bernhoven.nl](mailto:communicatie@bernhoven.nl)  
I: [www.bernhoven.nl](http://www.bernhoven.nl)



Ga naar  
[www.zorgkaartnederland.nl](http://www.zorgkaartnederland.nl)

