

Sterilisatie bij de man en zaadonderzoek na sterilisatie

In overleg met uw arts heeft u besloten om u te laten steriliseren, in medische termen heet deze ingreep een vasectomie. Er zijn verschillende mogelijkheden om ongewenste zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld de anticonceptiepil, het condoom en het spiraaltje). De vasectomie moet beschouwd worden als een definitieve anticonceptie methode; dat wil zeggen, in principe is de sterilisatie onomkeerbaar (onherroepelijk). Een sterilisatie is dan ook alleen een goede keuze wanneer u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt.

Door een onderbreking van de zaadleiters te bewerkstelligen wordt voorkomen dat zaadcellen het zaadvocht bereiken bij de gemeenschap. Een sterilisatie is een eenvoudige ingreep en is niet van invloed op uw seksuele leven. Sterilisatie is een zeer veilige vorm van anticonceptie. De ingreep wordt uitgevoerd door de uroloog.

Als de sterilisatie is uitgevoerd, is uiteraard controle van zaad nodig. Ook daarover informeert deze folder u. Bewaar de folder daarom goed. U kunt deze tekst ook vinden en downloaden van de website www.bernhoven.nl

Hoe bereidt u zich voor?

Thuis

- Wij verzoeken u, 7-10 dagen voor de ingreep, te scheren.
- Voor extra ondersteuning van de balzak na de ingreep, draagt u een strakzittende onderbroek en zwembroek. De uroloog kan u ook een suspensoir (mannen bh) geven.
- U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. U kunt gewoon eten en drinken.
- Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal deze medicatie in overleg met uw behandelend arts, enige dagen voor de ingreep worden gestaakt.
- Als u in het verleden een operatie aan uw teelballen of liesbreuk heeft ondergaan, dient u vooraf een afspraak op de polikliniek te maken bij de uroloog. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek urologie.

In het ziekenhuis

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek urologie route 150.

De ingreep

De ingreep duurt ongeveer twintig minuten. Onder plaatselijke verdoving maakt de uroloog een klein sneetje rechts en links in de balzak. Van beide zaadleiters wordt een stukje verwijderd en worden de uiteinden afgebonden en eventueel dichtgebrand. Tijdens de ingreep kunt u een trekkend gevoel in de liesen en/of onderbuik voelen. Na de ingreep wordt de huid gehecht met oplosbaar hechtingsmateriaal en wordt een verband aangebracht. Over het verband trekt u de strakzittende onderbroek en/of zwembroek aan. Deze houdt u gedurende minimaal 24 uur na de ingreep aan.

Na de ingreep

U mag na de ingreep niet zelf naar huis rijden.

Verzekering

U dient zelf bij u verzekering na te vragen of de sterilisatie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de balzak, liezen en/of onderbuik wat pijnlijk worden. Dat kan gepaard gaan met een beurs gevoel in de zaadballen en/of pijn tijdens het lopen. Hiervoor kunt u een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol. De pijn duurt meestal enkele dagen.

Krijg ik last van bijwerkingen?

Het is mogelijk dat de wondjes nog wat nabloeden. Gebruik zo nodig een gaasje in de onderbroek. Vaak ontstaat er een blauwe plek rond de plaats van de ingreep aan de balzak en aan de basis van de penis. Deze verkleuring verdwijnt na enkele dagen. Gedurende enkele dagen kunt u een “zwaar gevoel” in de onderbuik hebben, dit is normaal en wordt erger bij inspanning. Het gaat vanzelf weer over.

Adviezen voor thuis

- De dag na de ingreep, liefst twee dagen, houdt u rust.
- Na de ingreep kunt u over het algemeen uw dagelijkse werkzaamheden hervatten.
- Na een week kunt u weer gaan sporten.
- Na 1 dag mag u weer douchen. Echter de eerste 5 dagen mag u nog niet in bad of zwemmen.
- Na 5 dagen is geslachtsgemeenschap weer toegestaan. Vergeet niet een voorbehoedsmiddel te gebruiken.

Problemen thuis

In de volgende gevallen moet u contact opnemen:

- bij koorts boven de 38,5°C
- als de balzak erg gezwollen is
- bij hevige pijn
- als de wondjes blijven bloeden

Polikliniek urologie 0413- 40 19 68 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp 0413- 40 10 10 (buiten kantooruren)

Controle

In principe vindt er geen wondcontrole plaats. De hechtingen lossen vanzelf op na ongeveer twee tot vier weken. Ontstaan er onverhoopt toch wondproblemen, neem dan contact op met de polikliniek urologie.

Wat verder belangrijk kan zijn

- Er is een uiterst geringe kans dat de uiteinden van de zaadleiters weer aan elkaar groeien en er opnieuw doorgankelijkheid (=vruchtbaarheid) ontstaat. Zelf als controle van het zaadmonster liet zien dat er geen zaadcellen aanwezig waren, is dit mogelijk. Dit is gelukkig uiterst zeldzaam: bij ongeveer 1-3 per 1000 sterilisaties komt hernieuwde vruchtbaarheid voor.
- De ingreep heeft geen invloed op het mechanisme en het gevoel bij de zaadlozing. Na sterilisatie worden de zaadcellen, die nog steeds in de testikels worden gevormd, door het lichaam afgebroken.
- Na zaadlozing is aan het zaad met het blote oog niet te zien of iemand gesteriliseerd is. Het zaadmonster bestaat na sterilisatie uit prostaatvocht.
- Wie van beide partners zich laat steriliseren is een persoonlijke keuze. Het voordeel van sterilisatie bij de man is dat het een relatief lichte ingreep betreft die poliklinisch onder lokale

verdoving wordt uitgevoerd.

- Vasectomie geeft geen enkele bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (zoals aids en gonorrhoe). Om de kans te verminderen, blijft het gebruik van condooms raadzaam.

Zaadonderzoek na sterilisatie

Na de sterilisatie bent u pas onvruchtbaar als uit zaadonderzoek is gebleken dat er géén zaadcellen meer aanwezig zijn in het zaadmonster. Stop dus niet te vroeg met uw voorbehoedsmiddel.

Zaadmonster

Enkele instructies voor het verkrijgen van een optimaal zaadmonster:

- Na de sterilisatie moet uw zaad tenminste 10 weken na de ingreep onderzocht worden. In die periode moet u tenminste twintig zaadlosingen hebben gehad.
- Het is belangrijk dat het zaadmonster dat onderzocht gaat worden, verkregen is na een onthoudingsperiode van twee-zeven dagen. Dat wil zeggen dat er minimaal twee dagen en maximaal zeven dagen voorafgaande aan de zaadlozing ten behoeve van het zaadonderzoek, geen eerder zaadlozing heeft plaatsgevonden.
- Het meest betrouwbare zaadmonster wordt verkregen na een goede hygiëne (penis reinigen met alleen water en goed drogen) en na een zaadlozing door massage.
- Het zaad moet direct in een potje opgevangen worden (nooit eerst in een condoom opvangen). Zorg ervoor dat het potje op lichaamstemperatuur is door het potje vijf tot tien minuten in de hand te houden.
- Het is belangrijk dat u al het zaad in het potje verzamelt. Als een deel van het zaad verloren is, moet u dit aangeven op het potje of doorgeven aan het laboratorium.

Inleveren zaadmonster

U ontvangt een SMS-bericht in de week vóór u uw zaadmonster ingeleverd dient te hebben.

- Het zaadmonster moet binnen één uur na de zaadlozing bij het laboratorium van het ziekenhuis ingeleverd zijn (route 10, Bloedafname). U geeft het zaadmonster + het laboratoriumformulier rechtstreeks af bij de balie.
- Neem de patiëntenpas mee en het laboratoriumformulier.
- Noteer de datum, het tijdstip van zaadlozing en de onthoudingsperiode.
- Temperatuurswisselingen zijn schadelijk voor het zaadmonster. Voorkom temperaturen lager dan 20 graden of hoger dan 40 graden. Vervoer het potje bijvoorbeeld in broekzak of binnenzak.

Het inleveren kan alleen na het maken van een afspraak via het Laboratorium: 0413 - 40 19 12.

Uitslag

Nadat u het zaadmonster heeft ingeleverd bij het laboratorium belt u naar de polikliniek urologie om de datum (van inlevering van het zaadmonster) door te geven. Dit doet u alleen als u geen afspraak heeft gemaakt.

Ongeveer 1 ½ week nadat u het zaadmonster heeft ingeleverd, krijgt u de uitslag van het zaadonderzoek per post toegestuurd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het zaadonderzoek na sterilisatie, neem dan contact op met de polikliniek urologie of het laboratorium.

Polikliniek urologie:

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 68

Route 150

Laboratorium:

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 12

Route 010

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.

BernhovenNistelrodeseweg 10
5406 PT UDENPostbus 707
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40

E: communicatie@bernhoven.nlI: www.bernhoven.nl

Ga naar

www.zorgkaartnederland.nl