

## Voedingsadviezen bij overmatig braken tijdens de zwangerschap

U heeft last van overmatige misselijkheid en/of braken tijdens uw zwangerschap, ook wel hyperemesis gravidarum genoemd. In deze brochure informeren wij u over wat hyperemesis gravidarum is. Daarnaast geven wij in deze brochure adviezen die kunnen bijdragen aan het verminderen van uw klachten.

### Wat is overmatig zwangerschapsbraken (hyperemesis gravidarum)?

Veel vrouwen hebben in de eerste maanden van hun zwangerschap last van misselijkheid en braken. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten tussen de 12 en 20 weken van de zwangerschap. Bij sommige vrouwen zijn de klachten echter zo hevig dat zij onvoldoende voedsel en vocht kunnen binnenhouden. We spreken dan van overmatig zwangerschapsbraken (hyperemesis gravidarum). Er is dan sprake van hevige misselijkheid, braken en verminderde of geen eetlust. Doordat u onvoldoende voedingsstoffen en vocht binnenhoudt, kan dit leiden tot gewichtsverlies, uitdroging en een tekort aan vitaminen en mineralen. Door het vele braken kunt u vermoeid raken.

Er is geen duidelijke oorzaak voor hyperemesis gravidarum. Veranderingen in de hormoonhuishouding en erfelijke factoren lijken een rol te spelen. Hyperemesis gravidarum heeft, voor zover we nu weten, geen negatieve invloed op de gezondheid van uw ongeboren kind. Het is echter wel van invloed op het algemeen welbevinden en de conditie van de zwangere.

### Wat kunt u zelf doen?

Het belangrijkste doel is om niet te hoeven braken. Het is een misverstand dat een zwangere voor twee zou moeten eten. Als alles wat u eet of drinkt direct weer uitgebraakt wordt, is het beter om even niets te eten. Daarnaast is het verstandig om wel hele kleine beetjes te blijven eten. Door kleine beetjes te eten/drinken kun je uitdrogen voorkomen en de misselijkheid verminderen. Het is belangrijk om producten te kiezen die u verdraagt.

### Algemene adviezen

- Neem zoveel mogelijk rust, ook na inspanning (bv douchen).
- Sta langzaam op en vermijd plotselinge bewegingen.
- Ga na het eten niet direct liggen, maar blijf nog tien tot twintig minuten rechtop zitten.
- Neem rustig de tijd om te eten.
- Probeer zoveel mogelijk in de frisse lucht te zijn.

### Smaak- en reukveranderingen

*Het is mogelijk dat bepaalde producten u (tijdelijk) tegenstaan. Ook kan het zijn dat u bepaalde producten (tijdelijk) niet verdraagt.*

- Geuren (bijvoorbeeld van eten of parfum) kunnen invloed hebben op de misselijkheid. Probeer deze geuren te vermijden.
- Per dag kan de eetlust, smaakbeleving en geur wisselen. Probeer veel verschillende producten uit. Wat de ene keer geen succes is, kan de andere keer wel in de smaak vallen en omgekeerd.
- Temperatuur beïnvloedt de smaak; koude gerechten hebben vaak een minder sterke smaak dan warme gerechten.

- Gekoelde dranken gaan vaak beter dan ongekoelde dranken.
- Drinken met behulp van een rietje wordt vaak beter verdragen dan drinken uit een glas.

## Tips tegen de misselijkheid

- Misselijkheid kan ook worden veroorzaakt of verergerd door een lege maag. In dat geval kan hij worden 'weggegeten'.
- Een tekort aan vocht verergert de misselijkheid. Probeer daarom elke dag voldoende te drinken: dat is 1,5 tot 2 liter per dag. U kunt bijvoorbeeld water, thee, melk, karnemelk, yoghurt drank, chocolademelk, bouillon en frisdrank gebruiken.
- Een vieze smaak in de mond kan worden veroorzaakt doordat u te weinig drinkt. Drink daarom voldoende. Soms verdwijnt de vieze smaak door iets met een sterke smaak te eten, bijvoorbeeld een pepermuntje. Of zuig op iets zuurs, bijvoorbeeld een schijfje citroen of een stukje augurk.
- Eet meerdere kleine maaltijden, verdeeld over de dag. Neem in ieder geval 3 hoofdmaaltijden en 3 keer iets tussendoor.
- Houd rekening met uw misselijkheidspatroom gedurende de dag. Als u veel last hebt van ochtendmisselijkheid, maar u voelt zich wat beter rond het middaguur, eet dan wat minder 's ochtends en benut de uren dat u wat minder misselijk bent om wat meer te eten.
- Ochtendmisselijkheid vermindert soms door het eten van een toastje of beschuit voor het opstaan.
- Soms kan koken al resulteren in misselijkheid. Als u zelf kookt, gebruik dan de magnetron. Dan hebt u minder last van etensgeuren. Probeer of iemand anders voor u kan koken en blijf zelf uit de keuken. De maaltijd zelf hoeft namelijk niet altijd het probleem te zijn. Maak gebruik van kant-en-klaar producten. Koken, stoven of pocheren geven (net als klaarmaken in de magnetron) vaak minder hinderlijke geuren dan bakken en braden.
- Neem een koude maaltijd als u die beter verdraagt dan een warme maaltijd. Koud voedsel geurt bovendien minder. Voorbeelden zijn: een sandwich, huzaren-, pasta-, fruit- of groentesalades, koud vlees zoals alle soorten vleeswaren, maar ook (gerookte) kipfilet, fricandeau, gebraden gehakt of rollade. Hoe het eten eruit ziet, kan ook veel invloed hebben. Als eten moeilijk gaat, is het extra belangrijk dat het er aantrekkelijk uit ziet.

## Praktische adviezen per maaltijdmoment

### Broodmaaltijden

- Besmeer het brood royaal met roomboter of margarine;
- Gebruik dubbel hartig beleg;
- Een schaaltje pap of vla eet vaak gemakkelijker dan een boterham;
- Brood kan vervangen worden door muesli of andere ontbijtgranen;
- Probeer u verschillende broodsoorten zoals krentenbrood, roggebrood, suikerbrood, stokbrood of een worsten-, kaas- of saucijzenbroodje;
- Maak in plaats van een belegde boterham een tosti of wentelteefje;
- Neem eens een snack bij of op de boterham zoals ei, omelet, ragout, gebakken vis, huzarensalade, eiersalade, kroket, frikadel of knakworst.

### Warme maaltijd

- Eet liever geen bouillon of soep vlak voor de warme maaltijd, deze geven snel een vol gevoel;
- Voeg roomboter, margarine, (kook)room, slagroom, crème fraîche, kaas en/of mayonaise toe aan jus, sausjes, aardappelgerechten, pastagerechten of groenten;
- Voeg room of siroop aan het nagerecht toe;
- Rauwkost bevat weinig energie en geeft een vol gevoel.

### Tussendoortjes

- Wissel warme en koude tussendoortjes met elkaar af;
- Varieer met tussendoortjes en probeer nieuwe smaken en varianten uit;
- Voorbeelden van geschikte tussendoortjes: ontbijt of krentenbol royaal besmeerd, schaalte volle vla, kwark of vruchtenyoghurt, chocolademelk, handje noten, vleeswaar uit het vuistje, blokje kaas, gevulde koek, suikerwafel.

Als het ondanks deze adviezen niet lukt om voldoende energie binnen te krijgen, dan kan drinkvoeding een oplossing zijn. Overleg hierover met een diëtist.

## Specifieke adviezen bij de zwangerschap

Heeft u nog specifieke vragen omtrent wat u wel of niet mag eten tijdens de zwangerschap, kunt u de website van het voedingscentrum raadplegen [www.voedingscentrum.nl/etenzwanger](http://www.voedingscentrum.nl/etenzwanger)

## Vitamines en mineralen

Er wordt geadviseerd om tot 8 weken na de conceptie (10e week van de zwangerschap) dagelijks een supplement met 400 microgram foliumzuur per dag te gebruiken. Daarnaast is het advies om gedurende de gehele zwangerschap dagelijks 10 microgram vitamine D in te nemen.

Wilt u daarnaast nog extra vitamines en mineralen gebruiken? Kies dan voor een multivitaminen speciaal voor de zwangere vrouw. Als u dat doet, hoeft u geen extra vitamine D en foliumzuur meer te gebruiken (zie ook [www.voedingscentrum.nl](http://www.voedingscentrum.nl)).

---

*Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.*

*Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, [psb@bernhoven.nl](mailto:psb@bernhoven.nl).*

## Bernhoven

Nistelrodeseweg 10  
5406 PT UDEN

Postbus 707  
5400 AS UDEN

T: 0413 - 40 40 40  
E: [communicatie@bernhoven.nl](mailto:communicatie@bernhoven.nl)  
I: [www.bernhoven.nl](http://www.bernhoven.nl)



Ga naar  
[www.zorgkaartnederland.nl](http://www.zorgkaartnederland.nl)